

# Neo Pelvicillín



## ÓVULOS VAGINALES METRONIDAZOL - MICONAZOL - NEOMICINA POLIMIXINA B - CENTELLA ASIÁTICA

### COMPOSICIÓN:


Cada óvulo contiene:

Metronidazol.....	300,00 mg
Miconazol nitrato .....	100,00 mg
Neomicina sulfato .....	48,80 mg
Polimixina B sulfato.....	4,40 mg
Centella asiática .....	15,00 mg

Excipientes: Withepsol S 58 c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiinfeccioso vaginal



## INDICACIONES:

Tratamiento local de las vulvovaginitis específicas e inespecíficas, vulvitis, vaginitis, cervicovaginitis irritativas o bacterianas, candidiasis, tricomoniasis, vaginitis por *Gardnerella vaginalis* y/o giardias, infecciones mono y polimicrobianas. Leucorreas de cualquier etiología.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Salvo mejor criterio médico, comenzar el tratamiento con 1-2 óvulos por día; continuar con la aplicación de 1 óvulo por día al acostarse, hasta completar entre

6-10 días de tratamiento. Los óvulos deben introducirse profundamente por vía vaginal.

## PROPIEDADES:

### Acción farmacológica:

NEO-PELVICILLIN combina distintos principios activos para el tratamiento de las infecciones vulvovaginales. La Centella asiática aporta su acción cicatrizante, regeneradora y protectora de los tejidos; la neomicina y la polimixina cubren un amplio espectro bacteriano, actuando sobre gérmenes grampositivos y gramnegativos; el miconazol aporta su acción antimicótica y el metronidazol su acción tricomonocida, giardicida y amebicida.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula del producto o a derivados imidazólicos. Primer trimestre de embarazo.

## LACTANCIA.

Pacientes con discrasias sanguíneas. Enfermedades activas del SNC.

## PRECAUCIONES:

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática severa. El empleo de este producto no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. La base del óvulo vaginal puede alterar el látex de preservativos y diafragmas; no deben utilizarse durante el tratamiento.

## ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia: Si bien la absorción por vía vaginal no es significativa, no se aconseja utilizar este producto durante el primer trimestre del embarazo, ni durante el período de lactancia.

## INTERACCIONES:

Evitar lavados vaginales con sustancias alcalinas.

Debido a que existe una baja absorción de las drogas por vía tópica, no pueden excluirse interacciones sistémicas, por lo que se desaconseja la asociación con: alcohol (efecto antabús), warfarina, cumarina (potenciación del efecto anticoagulante) y disulfiram.

## ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

Raramente puede aparecer: ardor vulvovaginal, irritación y prurito. Teniendo en cuenta que se desconoce la proporción en que los diferentes principios activos se absorben a través de la mucosa vaginal, no puede excluirse la posibilidad de efectos sistémicos. El riesgo se eleva en pacientes con insuficiencia renal.

## SOBREDOSIFICACIÓN:

Administrando el producto por la vía indicada, no existe riesgo de sobredosis.

Ante la eventualidad de ingestión accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología.

## PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 6 óvulos

Conservar preferentemente a temperatura inferior a 25° C

NO INGERIR

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por Laboratorios TEMIS-LOSTALÓ de Argentina para Laboratorios EUROSTAGA S.A., Quito-Ecuador,

[www.eurostaga.com](http://www.eurostaga.com)