Prurica®

Policresuleno / Cincocaina

POLICRESULENO + CINCOCAÍNA

SUPOSITORIOS Y POMADA RECTAL

COMPOSICIÓN:

Cada supositorio contiene policresuleno 100 mg, clorhidrato de cincocaína 2,5 mg. Cada 100 g de pomada contienen: policresuleno 5,0 g; clorhidrato de cincocaína 1,0 g.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

PRURICA no se absorbe y no contiene esteroides, únicamente actúa sobre el canal ano-rectal.

El pH ácido del policresuleno le confiere la propiedad de coagular y eliminar las proteínas de los tejidos necrosados y permite una nueva epitelización en la zona afectada. De igual manera, actúa como agente antimicrobiano que impide la implantación de bacterias en el área de la lesión. En hemorroides y fisuras sangrantes ejerce un efecto hemostático a través de la coagulación de las proteínas plasmáticas y la acción vasoconstrictora en arteriolas seleccionadas, al contacto con su principio activo.

INDICACIONES: Hemorroides especialmente aquellas con inflamación y sangrado, fisuras anales, prurito anal, eczema anal en relación con afecciones ano-rectales. Tratamiento de heridas después de cirugía proctológica.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Durante el embarazo y la lactancia se deberá usar bajo estricta necesidad y supervisión médica.

REACCIONES ADVERSAS:

Molestias locales en forma de escozor o picazones. Por lo general son pasajeras y no requieren de interrupción del tratamiento.

MODO DE EMPLEO:

Introducir un supositorio en el recto después de una deposición, dos veces al día. Como mantenimiento se recomienda un supositorio diarios por el tiempo que el médico convenga. La pomada será aplicada dentro del recto usando el aplicador en forma de cánula. La aplicación se hará dos veces al día al comienzo del tratamiento y luego, según el cuadro clínico, una aplicación diaria s por el tiempo de convenga.

Consérvese a temperatura no superior a 25 grados C. Pequeños cambios de coloración no afectan la eficacia del producto.

PRESENTACIONES: Cajas con 7 supositorios. Tubo de pomada con 20 g

Elaborado por Laboratorios Mallén, S. A. República Dominicana para EUROSTAGA S. A. Quito-Ecuador.

www.eurostaga.com