

Tresité[®] F


triiodotironina / flumetasona

POMADA
USO TÓPICO

COMPOSICIÓN:

Cada 50 g de pomada contienen:
Triiodotironina:....200,00 microgramos
Pivalato de flumetasona:..10 miligramos
Excipientes..... C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Corticoide de uso tópico en combinación con triiodotironina de uso tópico.



INDICACIÓN: Tratamiento y prevención del queloide

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar la pomada dos veces al día con suave masaje digital. El tratamiento debe continuarse por espacio de 2- 6 meses.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES: Existen estudios que muestran que el uso de corticoides intralesionales previenen y mejoran el desarrollo de queloides; asimismo la triyodotironina tópica entre las acciones que puede producir estimula el crecimiento de la epidermis y aumenta el grosor de la dermis; induce la expresión y aumento del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF), promueve la cicatrización de las heridas por estimular la proliferación de queratina contribuyendo a la curación de los tejidos dañados e incrementa los procesos fisiológicos de anabolismo de la epidermis humana.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes. Infecciones cutáneas.

PRECAUCIÓN: No debe utilizarse en tuberculosis cutánea, dermatosis sifilítica o virales recientes, agudas y subagudas. No aplicarse sobre la conjuntiva ocular. No ingerir.

REACCIONES ADVERSAS: En casos aislados puede provocar prurito, ardor, irritación local, sequedad de la piel, hipopigmentación, atrofia cutánea local.

PRESENTACIÓN: Tubos colapsibles de pomada con 40 g.

Elaborado por Laboratorios TEMIS-LOSTALÓ de Argentina, para Laboratorios EUROSTAGA S.A. Quito-Ecuador

www.eurostaga.com