

# Artrós®

Extracto seco de *Harpagophytum procumbens*  
DC. ex. Meisn. (Harpagofito)



## TABLETAS RECUBIERTAS

### COMPOSICIÓN

Cada tableta recubierta contiene extracto seco de *Harpagophytum procumbens* DC. ex. Meisn. (Harpagofito) ..... 480,00 mg

**Excipientes:** celulosa microcristalina ph 102, almidón de maíz, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, opadry



## INDICACIONES

Coadyuvante en el tratamiento de dolores articulares leves, tales como dolor lumbar bajo, artritis y artrosis leve y moderada.

### Mecanismo de acción

Varios estudios preclínicos y clínicos han demostrado que el extracto de harpagofito tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio gracias a que inhibe la biosíntesis de la ciclooxigenasa y tromboxanos. También se ha demostrado que el harpagósido tiene la capacidad de bloquear la proteínquinasa que se le reconoce como mediador intracelular del dolor. Finalmente, varios estudios han demostrado fehacientemente que el harpagofito, a nivel molecular, en pacientes con artrosis y artritis, bloquea la síntesis de TNF alfa (factor de necrosis tumoral alfa) lo cual es un objetivo terapéutico importante en estos procesos dolorosos crónicos.

Posee además propiedades diuréticas y cicatrizantes, así como digestivas y estimulantes del apetito.

### Contraindicaciones

No administrar a pacientes con hipersensibilidad a la raíz de *Harpagophytum procumbens*, o a cualquier otro componente. No debe administrarse en pacientes con gastritis o úlcera gastroduodenal.

### Advertencias y precauciones

Debido a la presencia de algunos de sus componentes, principalmente harpagósidos, puede haber un efecto colerético y colagogo.

### Interacciones medicamentosas

No administrar concomitantemente con medicamentos antihipertensivos y antiarrítmicos.

### Efectos colaterales

En individuos sensibles al *Harpagophytum procumbens*, ocasionalmente pueden aparecer molestias gastrointestinales moderadas, tales como náuseas, vómitos, ligeras diarreas.

### Posología

**Adultos:** Tomar 1 tableta recubierta en el desayuno, almuerzo y cena con un vaso de agua

Tiempo máximo de uso

Utilizar durante un período de 1 mes.

PRODUCTO NATURAL PROCESADO DE USO MEDICINAL. ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A. AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA OE4-175 Y ESPERANZA, QUITO - ECUADOR., PARA LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. PAÚL RIVET E30-54 Y JOSÉ ORTÓN. EDIFICIO MOKAI, PISO 5, OFICINA 504. QUITO-ECUADOR