


# ARACYLINE®

## ANTIÁCIDO NEUTRALIZANTE

Cada sobre de suspensión oral contiene:

- Algeldrato .....620mg
- Magnesio hidróxido.....380 mg
- Aluminio hidróxido-magnesio carbonato, coprecipitado .....630 mg
- Excipientes: clorhexidina acetato, sucralosa, hidroxietilcelulosa, etanol (96 por ciento), aroma de menta y agua purificada.



**ARACYLINE** está indicado para el alivio sintomático de la acidez y ardor de estómago en adultos y niños mayores de 12 años, es un medicamento de venta libre.

## **Acidez gástrica**

La pirosis, ardor o acidez de estómago, es una sensación de quemazón dolorosa detrás del esternón que surge del estómago y puede irradiarse desde la zona del epigastrio "boca del estómago" hasta la garganta.

Se produce cuando el esfínter esofágico inferior permite el paso del contenido gástrico hacia el esófago, hay que tomar en cuenta que el adulto produce de 2 a 3 litros de jugo gástrico al día y la acidez se debe al ácido clorhídrico cuya producción se realiza por estímulo de la acción parasimpática (acetilcolina), de gastrina de las células G en el antro gástrico y/o la estimulación de histamina de células enterocromafines en todo el estómago.

Las células parietales estimuladas producen (ClH) ácido clorhídrico, con la intervención de la bomba de protones.

## **Síntomas de la acidez gástrica**

- Dolor ardiente en el pecho que ocurre de 30 a 60 minutos después de ingerir alimentos.
- Dolor que empeora en la noche al acostarse o inclinarse
- Sabor amargo o ácido en la boca
- Dificultad para tragar

## **Etiología de la acidez gástrica**

Trastornos digestivos:

- Dispepsia, (ERGE), gastritis y úlcera péptica, infección por *Helicobacter pylori*, hernia de hiato, divertículos esofágicos y síndrome de Zollinger-Ellison.
- Enfermedades musculares
- Embarazo
- Obesidad
- Factores psíquicos
- Comidas copiosas, ciertos alimentos, alcohol, café
- Tabaco

## **Posología y forma de administración**

ARACYLINE antiácido neutralizante se debe tomar:

- Vía oral
- Adultos y mayores de 12 años: La dosis recomendada es de 5 - 10 ml (de medio sobre a un sobre) de suspensión oral 4 veces al día, cuando aparezcan los síntomas.
- Se tomará de 20 minutos a una hora después de las tres comidas y otra vez antes de acostarse.
- No se debe exceder la dosis máxima de 40 ml de suspensión oral (4 sobres) al día.

## Contraindicaciones

ARACYLINE no se debe tomar cuando exista:

- Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes.
- Pacientes con insuficiencia renal grave.
- Pacientes con hipermagnesemia.
- Pacientes que estén cursando con cirugías abdominales o síntomas gástricos sin diagnosticar.
- No se debe administrar a niños menores de 12 años.

## Presentación

- ARACYLINE se presenta envasado en sobres de 10 ml, lista para su uso, que vienen en un envase que contiene 20 sobres de 10 ml.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Ramírez Francisco C. Hemorragia digestiva alta debida a úlcera péptica. Rev. Gastroent. Perú 16: 186 1996.
- 2.- Villanueva Palacios J, López D. Hemorragia del tracto digestivo superior en los Andes Peruanos. Rev. Gastroentero Perú 16(2): 99-104, 1996.
- 3.- Úlcera péptica. Clínicas Médicas de Norteamérica 4:864, 1991.
- 4.- Sack KB, GYRK, León Barúa R. Sesión sumaria de la reunión sobre "Infección por Helicobacter pylori en el mundo en desarrollo" Diagnóstico (Lima), 35:54, 1996.
- 5.- Ramírez Ramos A. Campylobacter pylori patología gastroduodenal. Ed. Santa Ana Lima 103-177, 1988.
- 6.- León-Barrúa R, Recavarren-Arce S, Ramírez-Ramos A. El aporte peruano a la investigación sobre Helicobacter pylori, Rev. Med Herediana (Lima) 2:173, 1991.
- 7.- Zuccaro G. Úlcera péptica sangrante: Patogénesis y tratamiento endoscópico. Clínicas Gastroenterológicas de Norteamérica Dic 22(4) 737-49, 1993.

# ARACYLINE®

## ALIVIO RÁPIDO DE LA ACIDEZ



**EUROSTAGA®**  
CORPORACIÓN FARMACÉUTICA