

# UROSEPTIC® Fosfomicina trometamol 3q

ARAMANOSAR®
D-MANOSA, PAC Y VITAMINAS



## **ANTIBIOTERAPIA**



#### EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN en infecciones del tracto urinario.

#### PAUTA CORTA

- · Aumenta el cumplimiento del tratamiento
- Reduce el riesgo de resistencias
- Reduce las recidivas
- Asegura la eficacia

# REDUCE LA CAPACIDAD PATÓGENA DE ESCHERICHIA COLI

• Impide que se adhiera al urotelio

#### **ALTO PERFIL DE SEGURIDAD**

- No presenta los efectos adversos como la nitrofurantoína y las quinolonas
- Tratamiento de elección en mujeres embarazadas



## **TERAPIA NATURAL**

ARAMANOSAR®

D-MANOSA, PAC Y VITAMINAS

#### LA PROTECCIÓN NATURAL E INNOVADORA frente a las infecciones urinarias.



### LA D-MANOSA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24H, RECOMENDADA POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA

El último protocolo de tratamiento de las Infecciones del Tracto Urinario (ITU), realizado por la Asociación Española de Urología (AEU) y por la Fundación para la Investigación en Urología (FIU), establece que la **D-manosa de liberación prolongada 24h** es una medida no farmacológica que **contribuye a reducir el uso de antibióticos** y, por lo tanto, a reducir los problemas asociados a los mismos.

En este documento se establece la importancia de la forma de liberación prolongada 24h porque, tal y como detallan, la D-manosa es un monosacárido que no se metaboliza y que se elimina en orina a las 3-4 horas de su ingesta. Como su acción es bloquear las fimbrias de los uropatógenos, impidiendo la adhesión de estos a la pared vesical, es primordial el uso de **D-manosa de liberación prolongada 24h** para asegurar la presencia de este compuesto en **orina durante todo el día.** 

#### ¿En qué casos recomiendan el uso de D-manosa de liberación prolongada 24h?

Se recomienda como una **alternativa útil** para **reducir de forma significativa** la cifra de **bacteriuria** y el número de episodios activos de **ITU.** 

Además, se nombra la utilidad en los siguientes casos:

- Como medida no farmacológica para el manejo de las infecciones urinarias recurrentes.
- En portadores de catéteres para evitar las infecciones urinarias.
- En **embarazadas** con bacteriuria asintomática o con historial de infecciones urinarias recurrentes se recomienda el uso durante el periodo de gestación.
- En diabéticos con bacteriuria asintomática.
- Cuando se relacionan los episodios de ITU tras el coito.

La D-manosa de liberación prolongada 24h es una alternativa segura, eficaz y sin contraindicaciones que evita el uso de antibióticos en numerosos pacientes



Ver protocolo en www.aeu.es

# **UROSEPTIC**®

**EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN** en infecciones del tracto urinario.





#### ■ 1 SOBRE DE INMEDIATO.

Refuerzo de un segundo sobre a las 24 horas si lo requiere.

# ARAMANOSAR®

LA PROTECCIÓN NATURAL E INNOVADORA frente a las infecciones urinarias.









- **1 SOBRE/DÍA** Preferentemente antes de acostarse y después de orinar.
- Prolonga el efecto de la antibioterapia: 1 sobre/día durante 30 días. 🗸
- Aumenta la protección: previene las cistitis recurrentes 1 sobre/día durante al menos 3 meses y la cistitis postcoital 1 sobre tras la relación sexual.
- Aumenta la protección en periodos de mayor sensibilidad:
   1 sobre/día durante el periodo de riesgo. ✓









