

# EUKET<sup>®</sup> SL

KETOROLACO TROMETAMINA 30 mg



## TABLETAS DISPERSABLES

### COMPOSICIÓN:

Cada comprimido de **EUKET SL<sup>®</sup>** (sublingual) contiene 30 mg de Ketorolaco Trometamina.

**Excipientes:** Celulosa microcristalina, crospovidona, aspartamo, acesulfamo potásico, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, sabor menta. Tabletas redondas, planas blancas, de color blanco tirando a crema. Dispersables

**Acción Terapéutica:** Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esterooidal (AINE).

**Indicaciones:** Tratamiento a corto plazo del dolor agudo, moderado.



**POSOLOGÍA:** Adultos y mayores de 16 años con peso corporal mayor a 50 kg: 1 comprimido de 30 mg, dejando debajo de la lengua a que se disuelva o disperse. Pudiéndose repetir la dosis cada 6 horas, con un máximo de 4 comprimidos en 24 horas, durante 2 a 5 días, como máximo.

**Efectos Colaterales:** Trastornos gastrointestinales (por ejemplo, malestar o dolor abdominal, deposiciones con sangre, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, etc.), hinchazón de las extremidades, debilidad generalizada, dolor muscular, aumento de peso, rubor, palidez, aumento de la presión arterial, trastornos del sistema nervioso central (por ejemplo, desórdenes del sueño, mareo, vértigo, dolor de cabeza, sudoración, boca seca, sed excesiva, nerviosismo, pensamientos anormales, depresión, estimulación, incapacidad para concentrarse, etc.), trastornos respiratorios (por ejemplo, dificultad para respirar, etc.), trastornos urinarios (por ejemplo, aumento de la frecuencia urinaria, etc.), manifestaciones de alergia (por ejemplo, picazón, etc.), trastornos de los sentidos (por ejemplo, anormalidades del gusto y de la vista, zumbido de oídos, etc.).

**Contraindicaciones:** Este medicamento no debe tomarse en: ciertas enfermedades respiratorias (asma, síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncospasmo), algunas enfermedades gastrointestinales (antecedentes de úlcera, perforación o sangrado gastrointestinal, úlcera péptica activa), antecedentes de trastornos de la coagulación, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave, postoperatorio de amigdalectomía en niños, analgesia obstétrica (durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto), hipovolemia de cualquier causa (por ejemplo, deshidratación, etc.). No se debe usar ketorolaco trometamol en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.

**Advertencias:** Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes: Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos (por ejemplo, ácido acetilsalicílico u otros AINEs).

**Tiempo de uso:** Este producto se usa por un período de tiempo no superior a 5 días, el que será indicado por su médico. La administración por más de 1 semana debe ser con control médico.

**Precauciones:** Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se recomienda usar este medicamento durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras está amamantando. No se recomienda usar este medicamento durante la lactancia.

**Capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria:** Usted deberá extremar las precauciones cuando realice este tipo de actividades, ya que este medicamento podría ocasionar mareo, vértigo, somnolencia.

**Niños:** No se ha estudiado el efecto de este medicamento en niños menores de 16 años, por lo que no se recomienda usarlo durante esta etapa de la vida. Tampoco se debe usar en niños recién operados de las amígdalas, independientemente de la edad. Ud. debe consultar a su médico antes de usar ketorolaco trometamol si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca). Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

**Interacciones Medicamentosas:** Este medicamento podría interactuar con: probenecid, metotrexato, litio, otros AINES (por ejemplo, ácido acetilsalicílico, piroxicam, diclofenaco, ibuprofeno, etc.), diuréticos (por ejemplo, furosemida, etc.), antihipertensivos (por ejemplo, enalapril, etc.), paracetamol, anticoagulantes (por ejemplo, heparina, warfarina, acenocumarol, dextrano, etc.) y medicamentos que pueden causar hipoprotrombinemia tales como ácido valproico, cefoperazona, cefamandol, cefotetán y plicamicina.

#### **Presentaciones:**

**Eukat SL:** Caja x 10 tabletas dispersables

Elaborado por Farmacid S.A. para Laboratorios Eurostaga S.A.