EUROSTAGA
CORPORACIÓN FARMACÉUTICA

Eulactos®

Lactasa 9000 FCC CÁPSULAS

Lea cuidadosamente este folleto antes de usar este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.
Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

¿QUÉ ES EULACTOS® CÁPSULAS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Grupo farmacológico: A09AA04 Metabolismo de productos alimenticios **EULACTOS®** es un producto para la intolerancia a la lactosa. Este contiene una enzima capaz de absorber el azúcar de la leche, función que el intestino delgado no puede realizar. **EULACTOS®** está indicado para intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

ANTES DE USAR EULACTOS® CÁPSULAS

No use **EULACTOS®** en caso de:
- Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- Embarazo.
- Lactancia.
- Niños menores de 12 años, sin supervisión médica.

Tenga especial cuidado con **EULACTOS®** en los siguientes casos:
- Debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias.
- Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo.
- En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa.
- En caso de presentar algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento.

Embarazo y lactancia
No se han documentado problemas debidos al uso de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.

PEDIATRÍA

No se han realizado estudios en la población pediátrica. No se aconseja su administración a menores da 12 años sin supervisión médica.

GERIATRÍA

No se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este producto.
Conducción de vehículos y operación de maquinarias Si siente somnolencia, mareo, hipotensión y dolor de cabeza como efectos secundarios cuando consume el medicamento **EULACTOS®**, no es seguro conducir un vehículo o manejar maquinaria pesada. No debe conducir un vehículo si el consumo del medicamento causa somnolencia, mareos o disminuye su presión sanguínea ampliamente. También se recomienda que los pacientes no beban alcohol con medicamentos ya que el alcohol puede aumentar los efectos secundarios de somnolencia. Por favor, verifique estos efectos en su cuerpo cuando se utiliza **EULACTOS®**. Siempre consulte con su médico para obtener recomendaciones específicas de las condiciones de su cuerpo y de su salud.
Uso de otros medicamentos
No se han reportado incompatibilidades con cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

CÓMO USAR EULACTOS® CÁPSULAS

El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de lactosa varia en los distintos alimentos, por los que cada paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de EULACTOS® que se aconseja utilizar, de acuerdo a sus
necesidades, hasta lograr su bienestar. **EULACTOS®** CÁPSULAS se administra por vía oral para producir la hidrólisis de la lactosa "in vivo", o sea provee la enzima que ayuda a la digestión de los alimentos lácteos.
Modo de administración: Las capsulas deben deglutirse con suficiente agua y pueden ser usadas inmediatamente antes o durante la ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o que contiene lactosa.
Como **EULACTOS®** actúa solamente sobre el alimento cuando se ingiere, se deberá usar cada vez que se lo consuma.
Para pacientes de 12 años en adelante, se recomienda tomar 1 cápsula con la primera porción de alimento lácteo o que contenga lactosa.
En niños menores de 12 años no se recomienda la ingesta de **EULACTOS®**, salvo mejor criterio médico.
En pacientes geriátricos, no se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este producto, por lo que se recomienda la misma posología que para adultos.
Si usted usa más **EULACTOS®** del que debiera:
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano. No hay reportes de sobredosis.
Si olvidó tomar **EULACTOS®**.
No utilice más de 2 capsulas por vez.
Se recomienda un tratamiento de 6 capsulas al día como máximo.
No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Hipersensibilidad: en raras ocasiones puede producirse erupción.
Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación de plenitud abdominal, vómitos.
Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN DE EULACTOS® CÁPSULAS

Mantenga **EULACTOS®** fuera del alcance y de la vista de los niños.
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

CADUCIDAD

No utilizar **EULACTOS®** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

INFORMACIÒN ADICIONAL

EULACTOS® CÁPSULAS
Composición:
Cada cápsula contiene:
Lactasa 9000 FCC (unidades de Lactasa)
Excipientes: Celulosa microcristalina, Dióxido de silicio coloidal, Croscarmelosa sódica, Polivinilpirrolidona, Estearato de magnesio.
Aspecto del producto y contenido del envase:
Cápsula dura de gelatina tipo 1 tapa blanca cuerpo celeste

Presentaciones Registradas:
Caja x 1 blísters x 10 cápsulas + Inserto
Caja x 2 blísters x 10 cápsulas + Inserto
Caja x 3 blísters x 10 cápsulas + Inserto
Caja x 1 blísters x 1 cápsulas + Inserto (Muestra Médica)
Caja x 2 blísters x 1 cápsulas + Inserto (Muestra Médica)
Caja x 3 blísters x 1 cápsulas + Inserto (Muestra Médica)
Registro Sanitario N°: 2832-MEN-0820
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
VENTA LIBRE

Elaborado por: Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A. Av. Manuel Córdova Galarza OE 4-175 y Esperanza. Quito - Ecuador.
Distribuido por: Laboratorios Eurostaga S.A. Paúl Rivet E30-54 y José Orton. Edificio Mokai, Piso 5, Oficina 504. Quito - Ecuador.