



330468



330468

# Tresité F

## 3-5-3' Triiodotironina Flumetasona

pomada

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

### FÓRMULA:

**Cada 100 g de pomada, contienen:**

3-5-3' Triiodotironina ..... 400,00 µg  
Pivalato de flumetasona ..... 20,00 mg  
Excipientes: Laurilsulfato de sodio 1500,00 mg; Propilenglicol 10,00 g,  
Alcohol cetílico 10,00 g; Vaselina líquida 15,00 g; Metilparabeno  
200,00 mg; Propilparabeno 100,00 mg; Cera blanca 2,00 g; Cera  
emulsionante 4,00 g; Agua destilada c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Corticoide de uso tópico en combinación con triiodotironina de uso tópico. Código ATC: D07XB01

### INDICACIÓN:

Tratamiento y prevención del queloide.

### POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar la pomada 2 veces por día con suave masaje digital. El tratamiento debe continuarse por espacio de 2 a 6 meses.

### CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES:

Existen estudios que muestran que el uso de corticoides intralesionales previenen y mejoran el desarrollo de queloides; asimismo, la Triiodotironina tópica entre las acciones que puede producir, estimula el crecimiento de la epidermis y aumento del grosor de la dermis, induce la expresión y aumento del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF), promueve la cicatrización de las heridas por estimular la proliferación de queratina contribuyendo a la curación de los tejidos dañados e incrementa los procesos fisiológicos de anabolismo de la epidermis humana.



**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes.  
Infecciones cutáneas.

**PRECAUCIONES:**

No debe utilizarse en tuberculosis cutánea, dermatosis sifilítica o virales recientes, agudas y subagudas. No aplicarse sobre la conjuntiva. No ingerir.

**REACCIONES ADVERSAS:**

En casos aislados puede provocar prurito, ardor, irritación, sequedad de la piel, hipopigmentación, atrofia cutánea local.

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

Ante la eventualidad de una ingesta oral, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/9247  
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

**ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS:**

No se conocen.

**PRESENTACIÓN:**

Tubos por 40 g de pomada.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Conservar a temperatura inferior a 25°C**

**No utilizar después de la fecha de vencimiento  
indicada en el envase**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 25.326

Elaborado en Laboratorios Temis Lostalo S.A.,  
Zepita 3178, C1285ABF, C.A.B.A., República Argentina.  
Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

**En Ecuador:** Importado y distribuido por Laboratorios Eurostaga S.A.  
Paúl Rivet E30-54 y José Orton. Edificio Mokai Piso 5 Oficina 504.  
Quito, Ecuador. Registro Sanitario: 571-MEE-1214. **Conservar a  
temperatura no mayor a 30°C. / Venta bajo receta médica.**

**En Guatemala:** Importado y Distribuido por Droguería  
Americana S.A. Registro Sanitario N°: PF-59100-2021

Fecha de última revisión: 17/06/2013

330468



**TEMIS  
LOSTALO**