



Composición

- | | |
|---|-----|
| ☐ Aspartato de L- Arginina | 1 g |
| ☐ Vitamina C | 1 g |

No contiene sucrosa, tiene sabor a naranja.

Uso

- Productor de óxido nítrico, coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial.
- Puede ser útil en la disfunción eréctil.
- Puede incrementar la formación de masa muscular.
- Puede estimular la producción de la hormona de crecimiento y de la insulina.
- Puede incrementar la resistencia física.

Precauciones

- Pacientes con reflujo gastroesofágico
- Pacientes que se encuentren tomando diuréticos IECA.
- Pacientes diabéticos con tratamiento de insulina, podría causar hipoglicemia.
- Pacientes que toman antihipertensivos, podría causar hipotensión.

Modo de uso

1 a 2 tabletas al día.

Forma Farmacéutica

Tabletas efervescentes.

Vía de administración

Para uso oral disuelva en medio vaso con agua.

Presentación

Caja con 20 tabletas efervescentes.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco en su envase original y a temperatura por debajo de los 30°C, protegiéndolo de la luz y el calor.

ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. QUITO - ECUADOR
DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS EUROSTAGA S. A. QUITO - ECUADOR