

## Composición

<input type="checkbox"/> Extracto seco de corteza de <i>Hintonia latiflora</i>	300 mg
<input type="checkbox"/> Cromo (Cloruro de cromo III 10%)	75 µg
<input type="checkbox"/> Ácido fólico	304,1 µg
<input type="checkbox"/> Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato)	2,10 mg
<input type="checkbox"/> Vitamina B2 (Riboflavina fosfato)	2,40 mg
<input type="checkbox"/> Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)	3 mg
<input type="checkbox"/> Vitamina B12 (Cianocobalamina 0,1 %)	1,5 µg
<input type="checkbox"/> Biotina	152 µg
<input type="checkbox"/> Vitamina C (Ácido ascórbico)	90 mg
<input type="checkbox"/> Vitamina E (D-alfa-tocoferol acetato)	15 mg
<input type="checkbox"/> Zinc (Acetato de zinc)	15 mg

**SUCONTRAL®** es un suplemento alimenticio en cápsulas

## Uso

Apoyo fisiológico con base en evidencia clínica disponible para prevenir y controlar niveles altos de glucosa.

Adultos con prediabetes o Diabetes Mellitus tipo 2 de leve a moderada, como coadyuvante del manejo médico y del estilo de vida, con foco en variabilidad y picos posprandiales.

## Precauciones

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- Hepatopatía activa o elevación inexplicada de transaminasas, evitar salvo criterio médico.
- La literatura describe casos raros de hepatitis aguda asociada al consumo de *Hintonia latiflora* y señales toxicológicas a dosis altas en modelos animales.
- Embarazo y lactancia: no existen datos en humanos por lo que se debe evitar su uso salvo indicación facultativa.
- En estudios clínicos y observacionales con **SUCONTRAL®** se reportó buena tolerabilidad y ausencia de hipoglucemias inducidas.

## Interacciones medicamentosas

- Antidiabéticos:** *Hintonia* no provoca hipoglucemia por sí sola, pero al mejorar el control glucémico, monitorizar y ajustar dosis si fuese necesario.
- Fármacos hepatotóxicos y alcohol:** extremar precaución por las señales hepáticas reportadas con *Hintonia latiflora*.

## Posología

- Dosis sugerida para adultos 1 cápsula, 2 veces al día, preferentemente con alimentos.
- Duración del tratamiento evaluar respuesta a los 3-6 meses.

#### **Vía de administración**

Vía oral, tragar la cápsula entera con agua; mantener hábitos dietarios y actividad física.

#### **Forma Farmacéutica**

Sobres con contenido granulado

#### **Presentación**

Caja de 30 cápsulas (blíster PVC + lámina de aluminio)

#### **Almacenamiento**

Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

Almacenar en un lugar fresco y seco en su envase original.

#### **Elaborado por:**

**Elaborado por:** GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH, ERASBURG-ALEMANIA

**Para:** LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. QUITO - ECUADOR.