

SUCONTRAL®

Sucontral®
Control natural de la glucosa

Composición

<input type="checkbox"/>	Extracto seco de corteza de <i>Hintonia latiflora</i>	100 mg
<input type="checkbox"/>	Cromo (Cloruro de cromo III 10%)	25 µg
<input type="checkbox"/>	Ácido fólico	101,1 µg
<input type="checkbox"/>	Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato)	0,70 mg
<input type="checkbox"/>	Vitamina B2 (Riboflavina fosfato)	0,80 mg
<input type="checkbox"/>	Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)	1 mg
<input type="checkbox"/>	Vitamina B12 (Cianocobalamina 0,1 %)	0,5 µg
<input type="checkbox"/>	Biotina	50 µg
<input type="checkbox"/>	Vitamina C (Ácido ascórbico)	30 mg
<input type="checkbox"/>	Vitamina E (D-alfa-tocoferol acetato)	5 mg
<input type="checkbox"/>	Zinc (Acetato de zinc)	5 mg

SUCONTRAL® es un suplemento alimenticio en cápsulas

Uso

Apoyo fisiológico con base en evidencia clínica disponible para prevenir y controlar niveles altos de glucosa.

Adultos con prediabetes o Diabetes Mellitus tipo 2 de leve a moderada, como coadyuvante del manejo médico y del estilo de vida, con foco en variabilidad y picos posprandiales.

Precauciones

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- Hepatopatía activa o elevación inexplicada de transaminasas, evitar salvo criterio médico.
- La literatura describe casos raros de hepatitis aguda asociada al consumo de *Hintonia latiflora* y señales toxicológicas a dosis altas en modelos animales.
- Embarazo y lactancia: no existen datos en humanos por lo que se debe evitar su uso salvo indicación facultativa.
- En estudios clínicos y observacionales con SUCONTRAL® se reportó buena tolerabilidad y ausencia de hipoglucemias inducidas.

Interacciones medicamentosas

- **Antidiabéticos:** *Hintonia* no provoca hipoglucemia por sí sola, pero al mejorar el control glucémico, monitorizar y ajustar dosis si fuese necesario.
- **Fármacos hepatotóxicos y alcohol:** extremar precaución por las señales hepáticas reportadas con *Hintonia latiflora*.

Posología

- Dosis sugerida para adultos 1 cápsula, 3 veces al día, preferentemente con alimentos.
- Duración del tratamiento evaluar respuesta a los 3–6 meses.

Vía de administración

Vía oral, tragar la cápsula entera con agua; mantener hábitos dietarios y actividad física.

Forma Farmacéutica

Sobres con contenido granulado

Presentación

Caja de 30 cápsulas (blíster PVC + lámina de aluminio)

Almacenamiento

Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

Almacenar en un lugar fresco y seco en su envase original.

Elaborado por:

Elaborado por: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH, ERASBURG-ALEMANIA

Para: LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. QUITO - ECUADOR.